

### TD 3 : Variables aléatoires à densité, fonctions de variable aléatoire

Une étoile désigne un exercice important.


**Exercice 1.** Soit  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-x/2} \left(1 + \frac{x}{2}\right) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Montrer que  $F$  est la fonction de répartition d'une loi de probabilité dont on déterminera la densité si elle existe.

- ★ **Exercice 2.** Rappeler la densité de la loi  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Soit  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , quelle est la loi de  $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$ ? Calculer  $\mathbb{E}[e^{\lambda Y}]$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ , et en déduire  $\mathbb{E}[e^{\lambda X}]$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ .
- ★ **Exercice 3.** Soit  $U$  une variable aléatoire de loi uniforme sur  $[0, 1]$ . Quelle est la loi de  $-\log U$ ?

**Exercice 4.** On suspend un laser à 1 m au dessus du sol. L'angle qu'il forme avec la verticale est aléatoire, notée  $\Theta$ , et suit la loi uniforme sur  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . On note  $X$  le point marqué au sol par le laser (voir la Figure ci-dessous). Donner la densité de la loi de  $X$ .



**Exercice 5.** Soit  $X$  une v.a. réelle de fonction de répartition  $F$ . Trouver en fonction de  $F$  les fonctions de répartition de  $X^2$ ,  $X^3$ ,  $[X]$ , (où  $[X]$  est la partie entière de  $X$ ) et  $\exp(X)$ .

**Exercice 6.** Soient  $X_1$  et  $X_2$  deux v.a. indépendantes de même loi uniforme sur  $[0, 1]$ . Déterminer les loi des v.a.  $U = \min(X_1, X_2)$  et  $V = \max(X_1, X_2)$ . En déduire les densités de probabilité correspondantes. Que vaut  $\mathbb{E}(|X_1 - X_2|)$ ?

**Exercice 7.** Soit  $X$  une v.a. de loi uniforme sur  $[0, 1]$  (de densité de probabilité  $f(t) = \mathbf{1}_{[0,1]}(t)$ ). Déterminer la fonction de répartition de la v.a.  $Y = \min(X, a)$ , ( $a \in [0, 1]$ ). Montrer que la loi de  $Y$  est une combinaison linéaire d'une loi à densité et d'une mesure de Dirac.

**Exercice 8.** Soit  $X$  une variable aléatoire positive de densité  $f(x)$ . Montrer que  $E[X] = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > t) dt$ .

*Remarque :* cette formule est valable même si  $X$  n'est pas à densité (pourvu que  $X \geq 0$ ).

- ★ **Exercice 9.** Soient  $X_1, X_2, \dots, X_n$  des v.a. indépendantes de même loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ ,  $\lambda > 0$ . On pose  $S_0 = 0$  et pour tout  $k = 1, 2, \dots, n$ ,  $S_k = X_1 + X_2 + \dots + X_k$ .
  1. Calculer la loi de  $(S_1, \dots, S_n)$ .
  2. Montrer que  $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  admet la densité de probabilité

$$f_n(t) = \lambda^n e^{-\lambda t} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(t).$$

3. Que vaut la fonction caractéristique de  $S_n$ ?
4. Calculer de deux manières  $\mathbb{E}(S_n)$  et  $\text{Var}(S_n)$ .